



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

**“ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y VIOLENCIA DOMÉSTICA EN
MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES EN PERÚ: ANÁLISIS DE LA
ENDES 2019”**

Tesis para optar el título profesional de:

MÉDICO CIRUJANO

Presentado por:

Lianette Catherine Escalante La Rosa (0000-0003-4574-5009)

Asesor:

Horacio Alfonso Chacón Torrico (0000-0003-4573-2099)

Lima - Perú
2022

ACTA DE SUSTENTACIÓN

Lima, 23 de agosto de 2022.

Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: Mg. Percy Antonio Rivadeneira Chumpitazi	<input type="checkbox"/>
Miembro: Mg. Fulton Paul Rivera Albinagorta	
Miembro: Méd. Katerine Mayté García Moreno	

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:
ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y VIOLENCIA DOMÉSTICA EN MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES EN PERÚ: ANÁLISIS DE LA ENDES 2019
 Presentada por
ESCALANTE LA ROSA, LIANETTE CATHERINE
 Para optar por el Título de Médica Cirujana

Con la asesoría de: Mg. Horacio Alfonso Chacón Torrico

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado su desempeño en la sustentación, concluyen de manera unánime (x) por mayoría simple () calificar a:

Tesis: ESCALANTE LA ROSA, LIANETTE CATHERINE		Nota (en letras): Diecisiete (17)	
Aprobado ()	Aprobado - Muy buena (x)	Aprobado - Sobresaliente ()	Desaprobado ()

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



Mg. Percy Antonio Rivadeneira Chumpitazi
 Presidente del Jurado



Mg. Fulton Paul Rivera Albinagorta
 Miembro 1



Mg. Horacio Alfonso Chacón Torrico
 Asesor



Méd. Katerine Mayté García Moreno
 Miembro 2

ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN Y VIOLENCIA DOMÉSTICA EN MUJERES CASADAS Y CONVIVIENTES EN PERÚ: ANÁLISIS DE LA ENDES 2019

ASSOCIATION BETWEEN DEPRESSION AND DOMESTIC VIOLENCE IN MARRIED AND CONVIVING WOMEN IN PERU: ANALYSIS OF ENDES 2019

Lianette Escalante La Rosa¹, Horacio Alfonso Chacón Torrico.¹

¹ Universidad Científica del Sur, Lima, Perú.

RESUMEN

Objetivos: Determinar la asociación entre violencia doméstica y síntomas depresivos en las mujeres casadas y convivientes del Perú de 15 a 49 años según la ENDES 2019. **Metodología:** Estudio de tipo observacional, de corte transversal, analítico, que se realizó mediante un análisis secundario de datos obtenidos por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2019 (ENDES 2019) realizada por el “Instituto Nacional de Estadística e Informática” (INEI). La población estuvo conformada por todas las mujeres casadas y convivientes en edad fértil de 15 a 49 años que participaron en la encuesta ENDES 2019 que a su vez respondieron la pregunta 700 del Cuestionario de Salud de la ENDES. Muestreo utilizado fue biepático, probabilístico de tipo equilibrado, estratificado e independiente. Se consideró la presencia de síntomas depresivos un puntaje ≥ 10 puntos a través del instrumento PHQ-9. Se calcularon *Odds Ratio* ajustados como medidas de fuerza de asociación obtenidos mediante un modelo de regresión logística.

Resultados: Se incluyeron a 8, 617 mujeres. El 29,9% sufrió cualquier tipo de violencia. La prevalencia de depresión fue de 7,1%. La prevalencia de depresión aumentó con la violencia psicológica (*odds ratio* ajustada [ORa]= 3,18; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 2,04 – 4,95) y violencia física (ORa = 1,80; IC95%: 1,17 – 2,78). Como factores asociados a la aparición de síntomas depresivos se identificaron: quintil de riqueza tanto medio [ORa = 1,87 (1,02 – 3,45)] como rico [ORa = 2,55 (1,23 – 5,32)] y tener estudios de primaria [ORa = 3,21 (1,19 – 8,64)].

Conclusión: La violencia doméstica está asociada de manera significativa con la aparición de síntomas depresivos.

Palabras clave (DeCS): Violencia doméstica, depresión, mujeres.

ABSTRACT

Objectives: To determine the association between domestic violence and depressive symptoms in married and cohabiting women in Peru aged 15 to 49 years according to ENDES 2019. **Methods:** Observational, analytical, cross-sectional design through secondary analysis based on the data obtained by the Demographic and Family Health Survey oh 2019 (ENDES 2019) carried out by the National Institute of Statistics

and Informatics (INEI). The population was made up of all married and cohabiting women of childbearing age from 15 to 49 years old who participated in the ENDES 2019 survey who in turn answered question 700 of the ENDES Health Questionnaire. The sampling used was two-stage, probabilistic, balanced, stratified and independent, at the departmental level and by urban and rural area. The presence of depressive symptoms was considered a score ≥ 10 points through the PHQ-9 instrument. Adjusted odds ratios were calculated as measures of strength of association obtained using a logistic regression model. **Results:** 8,617 women were included. 29.9% suffered any type of violence. The prevalence of depression was 7.1%. The prevalence of depression increased with psychological violence (adjusted odds ratio [aOR] = 3.18; 95% confidence interval [95%CI]: 2.04 – 4.95) and physical violence (aOR = 1.80; 95%CI: 1.17 – 2.78). As factors associated with the appearance of depressive symptoms, were identified: wealth quintile, both medium [aOR = 1.87 (1.02 – 3.45)] and rich [aOR = 2.55 (1.23 – 5.32)] and have primary school education [aOR = 3.21 (1.19 – 8.64)]. **Conclusions:** Domestic violence is significantly associated with the appearance of depressive symptoms.

Keywords (DeCS): Domestic violence, depression, women.