

CIENTÍFICA

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

FACULTAD DE MEDICINA
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

“MORBIMORTALIDAD DE PACIENTES CON SÍNDROME DE HELLP EN EL
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA”

Tesis para obtener el título profesional de:

MEDICO CIRUJANO

Presentado por:

Mia Paula Pinillos Peralta

Asesor:

Bryan Valcarcel Valdivia

Lima – Perú

2019

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 02 de febrero del 2019

Los integrantes del jurado de tesis:

Presidente: Dr. Akram Hernandez Vasquez

Integrante: Dra. Elsa Espinoza Altamirano

Integrante: Dr. Fernando Runzer Colmenares

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES CON SÍNDROME DE HELLP DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.

Presentada por el bachiller:

- MIA PAULA PINILLOS PERALTA

Para optar el Título Profesional de **Médico Cirujano**.

Asesorado por:

- MC. BRYAN STEVEN VALCARCEL VALDIVIA

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de los estudiantes en la sustentación, concluyeron de manera unánime (X) por mayoría simple () calificar a:

Integrante 1:	Nota (Escrito)
Aprobado (X)	CATORCE

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.

Presidente del Jurado

Miembro del Jurado

Miembro del jurado

Asesor

Morbimortalidad de pacientes con síndrome de HELLP en el Hospital María Auxiliadora

Morbidity and mortality of patients with HELLP syndrome in the Hospital María Auxiliadora

Mia Paula Pinillos Peralta^{1,b}, Bryan Valcarcel Valdivia^{1,a}.

1 Universidad Científica Del Sur, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina Humana, Lima, Perú

a Médico Cirujano

b Estudiante de Medicina

RESUMEN

Introducción: El síndrome de HELLP es una entidad que genera una alta mortalidad en las gestantes. En el Perú, la descripción de sus características demográficas, obstétricas y clínicas no están completamente documentadas.

Objetivo: Describir la morbimortalidad de las gestantes con síndrome HELLP

Diseño: Estudio retrospectivo, de carácter descriptivo.

Lugar: Hospital María Auxiliadora.

Participantes: Mujeres gestantes mayores de 18 años atendidas en el servicio de Ginecología del Hospital María Auxiliadora, durante el periodo enero – diciembre 2018.

Intervenciones: Se efectuó una revisión de las historias clínicas. En base a ello se tabuló la información y efectuó estadística descriptiva para analizar a las pacientes. Se uso frecuencia y porcentajes para las variables cualitativas, mientras que para las cuantitativas se empleó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de su distribución, y se reportaron con media y desviación estándar o con mediana y rango si presentaron distribución paramétrica o no paramétrica, respectivamente.

Resultados: Se analizó un total de 22 pacientes, la mayor cantidad se encontró entre los 20 – 30 años (59.1%) y eran solteras (54.5%). La edad gestacional más frecuente fue entre 28 – 34 semanas (38.1%). El 13.6% presentó controles prenatales inadecuados y un caso no presentó ninguno. La mortalidad fue de 18%, de ellas la mayor parte presentó tiempo prolongado de atención, estadioje HELLP 1, controles prenatales inadecuados/sin controles prenatales.

Conclusión: El síndrome de HELLP es una complicación de la gestación, la cual tiene una importante mortalidad dentro de las gestantes atendidas en el Hospital María Auxiliadora.

Palabras clave: Síndrome HELLP; Mortalidad Materna; Epidemiología Descriptiva

ABSTRACT

Introduction: The HELLP syndrome is an entity that generates a high mortality in pregnant women. In Peru, its demographic, obstetric and clinical description is not fully documented.

Objective: To describe the morbidity and mortality of pregnant women with HELLP syndrome

Design: Retrospective study, of descriptive nature.

Interventions: María Auxiliadora Hospital.

Patients: Pregnant women older than 18 years attended in the Gynecology service of the María Auxiliadora Hospital during the period January - December 2018.

Main outcomes measures: A review of the medical records of the patients was carried out. Based on this, the information was tabulated, and descriptive statistics were performed to analyze the patients. Frequency and percentages were used for the qualitative variables, while for the quantitative ones, the Shapiro-Wilk test was used to determine the normality of its distribution, and they were reported with mean and standard deviation or with median and range if they presented parametric or non-parametric distribution, respectively.

Results: A total of 22 patients were analyzed, the largest number was found between 20 - 30 years (59.1%) and were single (54.5%). The most frequent gestational age was between 28 - 34 weeks (38.1%). 13.6% presented inadequate prenatal controls and one case presented none. Mortality was 18%, most of them with prolonged attention, HELLP 1 staging, inadequate prenatal controls / without prenatal controls.

Conclusion: The HELLP syndrome is a complication of pregnancy, which has an important mortality in pregnant women attended at the María Auxiliadora Hospital.

Key words: HELLP Syndrome; Maternal Mortality; Epidemiology, Descriptive