


UNIVERSIDAD
CIENTÍFICA
DEL SUR



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA
ESPECIALIDAD DE IMPLANTOLOGÍA ORAL

IMPLANTES CORTOS

**TESINA PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN
IMPLANTOLOGÍA ORAL**

CD. JUAN MIGUEL TAIRA MOROMISATO

Asesor: Dr. José Antônio Vieira Tinoco

Lima – Perú

2014





**ASOCIACIÓN BRASILEIRA DE ODONTOLOGÍA
REGIONAL BAJADA SANTISTA**



UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

JUAN MIGUEL TAIRA MOROMISATO

IMPLANTES CORTOS

LIMA – PERÚ

2014

JUAN MIGUEL TAIRA MOROMISATO

IMPLANTES CORTOS

MONOGRAFIA PRESENTADA A LA
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR Y A LA
ASOCIACIÓN BRASILEIRA DE ODONTOLOGÍA
– REGIONAL BAIXADA SANTISTA COMO
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TITULO DE ESPECIALISTA EN
IMPLANTOLOGIA

LIMA - PERÚ

2014

Presentación de la monografía el 23/05/14, al curso de especialización en
Implantología, Universidad Científica del Sur (UCSUR) – ABO/Baixada Santista

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Agradezco al Dr. José Carlos Cúvelo, al Dr. Valter Castro y a todo el equipo del ABO por la formación académica y profesional; al Dr. Valdivia por su confianza y aliento para concluir la especialidad; a Marisol Castilla por el ánimo para emprender el curso en Santos, y a todos mis compañeros, por la amistad y las excelentes relaciones que hemos compartido en cada reunión.

RESUMEN

El presente trabajo constituye una revisión de la literatura actual, sobre la posibilidad de colocar implantes cortos como alternativa de tratamiento, en vez de realizar cirugías previas para la remodelación del reborde alveolar, y la colocación de implantes largos en ausencia de hueso; para ello, se consideraron los estudios comparativos clínico controlados con seguimiento de hasta 5 años, la biomecánica de los implantes oseointegrados, la proporción corona-implante, la microestructura de la superficie de los implantes y algunos factores de riesgo.

Los implantes cortos ($\leq 8\text{mm}$) podrían ser preferibles a los implantes más largos ($\geq 10\text{mm}$) colocados en la región posterior maxilar aumentado verticalmente con injerto óseo, debido a las mayores complicaciones biológicas, especialmente en la región mandibular. Además, son menos caros, la colocación de la restauración protésica es más rápida, y está asociado a menor morbilidad. Sin embargo, se requiere más evidencias científicas con seguimientos de mayor tiempo.

Palabras claves: Implantes cortos, tasa de éxito, proporción corona-implante, distribución del stress.