



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

“Asociación entre violencia de pareja y tamizaje de cáncer de cuello uterino:
análisis secundario, 2019”

Tesis para optar el título profesional de:
MÉDICO CIRUJANO

Presentado por:

Sebastián Cuadros Couto (0000-0003-4940-1449)

Gabriela Paola Guerrero Nuñez (0000-0003-1277-7725)

Asesor:

Aleksandar Cvetković Vega (0000-0003-0976-9062)

Lima – Perú

2021

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 21 de mayo de 2021.

Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: Méd. Juan Jhonnal Alarco Urquizo	<input type="checkbox"/>
Miembro: Méd. Juan Rodrigo Vargas Fernández	
Miembro: Méd. Junior Smith Torres Román	

Se reúnen para evaluar la tesis titulada:

“ASOCIACIÓN ENTRE VIOLENCIA DE PAREJA Y TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO: ANÁLISIS SECUNDARIO, ENDES 2019”

Presentada por los estudiantes:

Guerrero Nuñez, Gabriela Paola y Cuadros Couto, Sebastián

Para optar el Título Profesional de Médicos Cirujanos.

Asesorados por: Méd. Aleksandar Cvetković Vega

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño de los estudiantes de la carrera de Medicina Humana en la sustentación, concluyen de manera unánime (x) por mayoría simple () calificar a:

Tesis: Guerrero Nuñez, Gabriela Paola			Nota (en letras): Trece (13)
Aprobado (x)	Aprobado - Muy buena ()	Aprobado - Sobresaliente ()	Desaprobado ()
Tesis: Cuadros Couto, Sebastián			Nota (en letras): Trece (13)
Aprobado (x)	Aprobado - Muy buena ()	Aprobado - Sobresaliente ()	Desaprobado ()

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



Méd. Juan Jhonnal Alarco Urquizo
Presidente del Jurado



Méd. Aleksandar Cvetković Vega
Asesor



Méd. Juan Rodrigo Vargas Fernández
Miembro 1



Méd. Junior Smith Torres Román
Miembro 2

ASOCIACIÓN ENTRE VIOLENCIA DE PAREJA Y TAMIZAJE DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO: ANÁLISIS DE UNA BASE DE DATOS POBLACIONAL, 2019

ASSOCIATION BETWEEN PARTNER VIOLENCE AND CERVICAL CANCER SCREENING: ANALYSIS OF A POPULATION DATABASE, 2019

Sebastián Cuadros Couto¹, Gabriela Paola, Guerrero Núñez¹, Aleksandar Cvetkovic Vega.^{1,2}

RESUMEN

Introducción: El acceso al tamizaje para cáncer de cérvix es una herramienta de salud pública importante, que podría verse limitada en su aplicación por factores relacionados con la violencia de pareja. **Objetivos:** Conocer la asociación entre violencia de pareja y tamizaje para cáncer de cuello uterino en las mujeres participantes de la ENDES 2019. **Métodos:** Diseño observacional, analítico, transversal mediante análisis secundario. La población está conformada por todas las mujeres que participaron de la encuesta ENDES 2019; mayores de 18 años y se excluyó a aquellas en las que se pierdan los datos de interés. Muestreo utilizado fue bietápico, equilibrado, estratificado e independiente, a nivel departamental y por área urbana y rural. **Resultados:** Se contó con una población total de 8660 personas. Las personas de 36 – 49 años fue el grupo predominante (50.23%), el 98.8% eran mujeres sin pareja. Según la residencia, el 78.9% vivía en área urbana y el 58.7% en costa. El 69.3% tenía un trabajo actual y el 78.1% tenía algún seguro de salud. El 38.3% refirió haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, y el 83.34% alguna vez se realizó el tamizaje de cáncer de cuello uterino. **Conclusiones:** La prevalencia de tamizaje de cáncer de cuello uterino fue mayor en aquellas mujeres que han tenido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Además, se pudo determinar asociación entre el tamizaje con el grupo etario, nivel socioeconómico, contar con seguro de salud y la región en la cual viven.

Palabras clave (DeCS): violencia, violencia de género, tamizaje, cáncer de cuello uterino.

ABSTRACT

Introduction: Access to cervical cancer screening is an important public health tool, which could be limited in its application by factors related to intimate partner violence. **Objectives:** Know the association between intimate partner violence and cervical cancer screening in women participating in the ENDES 2019. **Methods:** Observational, analytical, cross-sectional design through secondary analysis. The population is made up of all the women who participated in the ENDES survey; over 18 years of age and those in which the data of interest were lost were excluded. The sampling used was two-stage, balanced, stratified and independent, at the departmental level and by urban and rural area. **Results:** There was a total population of 8,660 people. People aged 36-49 years were the predominant group (50.23%), 98.8% were women without a partner. According to residence, 78.9% lived in urban areas and 58.7% on the coast. The 69.3% had a current job and 78.1% had some health insurance. 38.3% reported having suffered some type of violence by their partner, and 83.34% had ever been screened for cervical cancer. **Conclusions:** The prevalence of cervical cancer screening was higher in those women who have had some type of violence by their partner. In addition, it was possible to determine an association between the screening with the age group, socioeconomic level, having health insurance and the region in which they live.

Keywords (DeCS): violence, violence against women, domestic violence, screening, cervix.

¹ Universidad Científica del Sur, Lima, Perú

² Universidad Continental, Lima, Perú