



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA**

**“FRECUENCIA DE TERCEROS MOLARES RETENIDOS CON  
RELACIÓN AL BIOTIPO FACIAL. UN ESTUDIO  
TRANSVERSAL.”**

Tesis para optar el Título de:

**SEGUNDA ESPECIALIDAD EN RADIOLOGÍA BUCAL Y  
MAXILOFACIAL**

Presentado por:

**Taylor Augusto Zeta Rodriguez (0000-0001-6235-2819)**

Asesor:

**Luis Ernesto Arriola Guillen (0000-0003-0010-5948)**

Lima – Perú

2023

### ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

Lima, 12 de enero de 2023.

Los integrantes del Jurado de tesis:

Presidente: Mg. Esp. Carlos Vladimir Espinoza Montes.
Miembro: Dra. Esp. Evelyn Álvarez Vidigal.
Miembro: Dra. Ann Rosemary Chanamé Marín.

Se reúnen para evaluar la tesis titulada: FRECUENCIA DE TERCEROS MOLARES RETENIDOS CON RELACIÓN AL BIOTIPO FACIAL. UN ESTUDIO TRANSVERSAL.

Presentada por el estudiante:

- Taylor Augusto Zeta Rodríguez

Para optar el Título de Segunda Especialidad en Radiología Bucal y Maxilofacial.

Asesorada por: Dr. Luis Ernesto Arriola Guillén.

Luego de haber evaluado el informe final de tesis y evaluado el desempeño del estudiante de la Carrera de Estomatología en la sustentación, se concluyen de:

Manera unánime (  )

Por mayoría (  )


Calificar a:

Tesisista: Taylor Augusto Zeta Rodríguez		Nota (en letras): 17	
Aprobado ( <input type="checkbox"/> )	Aprobado - Muy buena (X)	Aprobado - Sobresaliente ( <input type="checkbox"/> )	Desaprobado ( <input type="checkbox"/> )

Los miembros del jurado firman en señal de conformidad.



**Carlos Vladimir Espinoza Montes**  
Presidente del Jurado  
DNI. 09298400



**Dra. Ann Rosemary Chanamé Marín**  
Miembro 2  
DNI. 42767874



**Dra. Esp. Evelyn Álvarez Vidigal**  
Miembro 1  
DNI. 10452711



**Dr. Luis Ernesto Arriola Guillén**  
Asesor  
DNI. 40990364



UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR  
 POSGRADO ESTOMATOLOGÍA  
 INDICAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD O GRADO ACADÉMICO A OPTAR  
 DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE CONTENIDO DE INFORME FINAL DE TESIS<sup>13</sup>

Lima, 18 de enero del 2023

Señor:

Percy Mayta Tristán

**Director General de Investigación, Desarrollo e Innovación**

**Universidad Científica del Sur**

**Presente.-**

De nuestra consideración,

Yo Taylor Augusto Zeta Rodríguez, estudiante/ egresado del Posgrado Estomatología de la Universidad Científica del Sur, en conjunto con el asesor/Luis Ernesto Arriola Guillen, declaramos que este informe final de tesis/ trabajo de investigación titulado **“FRECUENCIA DE TERCEROS MOLARES RETENIDOS CON RELACIÓN AL BIOTIPO FACIAL. UN ESTUDIO TRANSVERSAL.”**, sustentado para obtener el título de Segunda Especialidad en radiología bucal y maxilofacial es original.


Es decir, no contiene plagio parcial ni total, cuando se utilizó información de fuentes externas se reconoció la autoría mediante la adecuada citación y los resultados obtenidos son producto entero de mi investigación y no han sido falseados ni fabricados. Todo esto en cumplimiento del Código de ética en la investigación, Reglamento del Comité de Integridad Científica, Reglamento de Propiedad Intelectual, Normas y procedimientos de los trabajos de investigación para la obtención de títulos profesionales y grados académicos<sup>14</sup>, que afirmamos conocer en su totalidad.

Por ello, en caso de identificarse alguna situación de plagio, falsificación o fabricación de resultados, nos allanamos al proceso de investigación que establezca la Universidad y las posibles sanciones que pudieran surgir.

Firmamos en conformidad con lo declarado,



NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS  
 TAYLOR AUGUSTO ZETA RODRIGUEZ  
 DNI: 43703760



NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS  
 Luis Ernesto Arriola Guillen  
 DNI: 40990364

<sup>13</sup> En conformidad con la Resolución del Consejo Directivo N° 084-SUNEDU/CD

<sup>14</sup> Los documentos están en: <https://investigacion.cientifica.edu.pe/reglamentos/>

## INFORME DE REVISIÓN DE ORIGINALIDAD

**Título del documento evaluado.** Frecuencia de terceros molares retenidos con relación al biotipo facial. Un estudio transversal

**Autores.** Taylor Augusto Zeta Rodríguez.

**Mecanismo de revisión de originalidad.** Evaluación con Turnitin (ID 2000799783).

**Resultado de la evaluación.** 9%

**Revisado por.** Lic. Magaly Guerrero H.

**Comentarios sobre la revisión.** Filtros usados: excluir fuentes de menos de 12 palabras.

### Frecuencia de terceros molares

#### INFORME DE ORIGINALIDAD



#### FUENTES PRIMARIAS

1	<a href="https://repositorio.urp.edu.pe">repositorio.urp.edu.pe</a> Fuente de Internet	1%
2	Luis Eduardo Abello Ariza. "Avaliação imaginológica da relação topográfica do canal retromolar, com o terceiro molar inferior, de acordo com a Classificação de Winter, por meio da tomografia computadorizada de feixe cônico", Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA), 2022 Publicación	1%
3	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	1%
4	Submitted to Universidad Catolica De Cuenca Trabajo del estudiante	1%
5	<a href="https://worldwidescience.org">worldwidescience.org</a> Fuente de Internet	1%
6	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Fuente de Internet	1%

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo a mi esposa Jennifer y a mis hijos Gael y Alanna que me han impulsado durante toda esta etapa y me han proporcionado un valioso apoyo. De igual manera a mis padres y hermanos que siempre me apoyan en mi formación profesional.

**Taylor Augusto Zeta Rodriguez**

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco a Dios por brindarme salud para completar esta etapa satisfactoriamente.

A mi esposa Jennifer por apoyarme e impulsarme, a mis hijos Gael y Alanna por ser mi motivo y razón por la que siempre busco superarme.

A mi padre, Augusto por siempre estar allí cuando necesité un consejo, mi madre Aereopajita por siempre regresarme al camino cuando tuve algunas dudas.

A mis hermanos Gino y Mayra por apoyarme en este proceso.

Al Mg. Esp. Luis Ernesto Arriola Guillen, por su análisis crítico en todo el proceso de esta investigación.

A la Dr. Esp. Jhoana Llaguno Rubio por su valioso tiempo, paciencia y dedicación además de su guía siempre activa.

A todos los Dres. que nos acompañaron en cada una de las clases por brindarnos sus conocimientos sin limitaciones.

A mis compañeros de la especialidad por su humildad, amistad y crítica ya que siempre hay algo nuevo que aprender de cada uno de ellos.

**Taylor Augusto Zeta Rodriguez**

## RESUMEN

**Objetivo:** Identificar la frecuencia de terceros molares retenidos con relación al biotipo facial utilizando estudios 2D (panorámicos y cefalométricos) de pacientes que acudieron al centro de imágenes ZETA-EXMED en el periodo noviembre del 2018 a diciembre del 2021, en la ciudad de Lima, Perú. **Metodología:** el tipo de estudio de esta investigación es observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Se evaluaron 6000 casos, cada uno compuesto de una imagen radiográfica panorámica y una cefalométrica, ambas tomadas al paciente en la misma fecha, de las cuales solo fueron incluidos en la investigación un total de 150 casos, por cumplir con los criterios de selección. Las mediciones se realizaron por un investigador entrenado y calibrado, utilizando el software Nemoceph para los trazados cefalométricos. Se utilizó para el análisis estadístico el programa SPSS versión 1.0.0.1401 (SPSS Inc., EE. UU.) y la prueba Chi cuadrado ( $p < 0.05$ ). **Resultados:** De los 150 casos revisados, 91 correspondieron al sexo femenino (60.66%) y 59 al sexo masculino (39.33%), dando como resultado que el biotipo dólcofacial se presentó con mayor frecuencia en estos, con un total de 27 casos (45.80%), mientras que, en mujeres, el biotipo braquifacial fue el de mayor frecuencia, con un total de 35 casos (38.50%). Así mismo, del total de terceros molares retenidos evaluados (403 piezas), 141 se presentaron en casos con biotipo dólcofacial, seguido del biotipo mesofacial con 139 piezas y finalmente el biotipo braquifacial con 123 piezas. Respecto a la evaluación de los terceros molares retenidos en relación con su posición y biotipo facial, se encontró 63 3MR en posición mesioangular y 28 en posición distoangular en dólcofacial, seguido de 48 piezas en posición vertical en braquifacial. **Conclusiones:** No existe una relación significativa entre la cantidad de terceros molares retenidos y su posición, en relación con el biotipo facial, pero si respecto a la relación entre el sexo y el biotipo facial, encontrando que los varones presentan un biotipo dólcofacial con mayor frecuencia y las mujeres el biotipo braquifacial.

**Palabras clave:** frecuencia, terceros molares retenidos, biotipo facial.

## SUMMARY

**Objective:** This study aims to determine the frequency of retained third molars in relation to facial biotype, the data were collected by using the patients' 2D studies (panoramic and cephalometric) attending the imaging center ZETA-EXMED in the period November 2018 to December 2021, in the city of Lima, Peru. **Methods:** The type of study used for this research are observational, descriptive, cross-sectional, and retrospective. For the present study, 6000 cases were evaluated, each case consists of one panoramic radiographic image and one cephalometric image, both taken to the patient on the same date, of these, only 150 cases that met the selection criteria were included in this study. Measurements were done by a trained and calibrated researcher, using NemoCeph software for the cephalometric tracing. The statistical analysis was done using SPSS program version 1.0.0.1401 (SPSS Inc., USA) and the Chi square test ( $p < 0.05$ ). **Results:** Of the 150 cases observed, 91 were women (60.66%) and 59 were men (39.33%). According to the results, dolichofacial biotype had the highest frequency among males with a total of 27 cases (45.80%), while the brachyfacial biotype was more prevalent among females, with a total of 35 cases (38.50%). In addition, out of the total number of retained third molars evaluated (403 pieces), 141 were present in cases with dolichofacial biotype, followed by the mesofacial biotype with 139 pieces and finally the brachyfacial biotype with 123 pieces. Regarding the evaluation of retained third molars according to their position and facial biotype, 63 retained third molars were found in mesioangulated position and 28 retained third molars in dolichofacial / distoangular position, followed by 48 pieces in the vertical position in brachyfacial. **Conclusions:** There is not significant association between the quantity of retained third molars and their positions, in relation to facial biotype, although there is a significant association between facial biotype and the patient's sex, so it was concluded that Dolichofacial biotype has the highest frequency in males, while the Brachyfacial biotype is seen more frequently among females.

**Keywords:** Frequency, retained third molars, facial biotype.

**“FRECUENCIA DE TERCEROS MOLARES RETENIDOS  
CON RELACIÓN AL BIOTIPO FACIAL. UN ESTUDIO  
TRANSVERSAL”**

**“FREQUENCY OF RETAINED THIRD MOLARS IN  
RELATION TO FACIAL BIOTYPE. A CROSS-SECTIONAL  
STUDY”**

**Taylor Augusto Zeta Rodriguez<sup>1\*</sup>**

1. División de Radiología Bucal y Maxilofacial, Universidad Científica del Sur, Lima, Perú. Email: [taylor\\_zeta@hotmail.com](mailto:taylor_zeta@hotmail.com)  
<http://orcid.org/0000-0001-6235-2819>

Artículo recibido: 02/03/2022

Arbitrado por pares

Artículo aceptado: 06/06/2022

Artículo publicado: 27/06/2022

**\*Autor de correspondencia:** Taylor Augusto Zeta Rodriguez  
[taylor\\_zeta@hotmail.com](mailto:taylor_zeta@hotmail.com)

CITAR COMO: Zeta Rodriguez TA. Frecuencia de terceros molares retenidos con relación al biotipo facial. un estudio transversal. Rev Cient Odontol (Lima). 2022; 10(2): e105. DOI: 10.21142/2523-2754-1002-2022-105

---

<sup>1</sup> Facultad de Odontología, Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú.

## RESUMEN

**Objetivo:** Identificar la frecuencia de terceros molares retenidos con relación al biotipo facial utilizando estudios 2D (panorámicos y cefalométricos) de pacientes que acudieron al centro de imágenes ZETA-EXMED en el periodo noviembre del 2018 a diciembre del 2021, en la ciudad de Lima, Perú. **Metodología:** el tipo de estudio de esta investigación es observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Se evaluaron 6000 casos, cada uno compuesto de una imagen radiográfica panorámica y una cefalométrica, ambas tomadas al paciente en la misma fecha, de las cuales solo fueron incluidos en la investigación un total de 150 casos, por cumplir con los criterios de selección. Las mediciones se realizaron por un investigador entrenado y calibrado, utilizando el software Nemoceph para los trazados cefalométricos. Se utilizó para el análisis estadístico el programa SPSS versión 1.0.0.1401 (SPSS Inc., EE. UU.) y la prueba Chi cuadrado ( $p < 0.05$ ). **Resultados:** De los 150 casos revisados, 91 correspondieron al sexo femenino (60.66%) y 59 al sexo masculino (39.33%), dando como resultado que el biotipo dólcofacial se presentó con mayor frecuencia en estos, con un total de 27 casos (45.80%), mientras que, en mujeres, el biotipo braquifacial fue el de mayor frecuencia, con un total de 35 casos (38.50%). Así mismo, del total de terceros molares retenidos evaluados (403 piezas), 141 se presentaron en casos con biotipo dólcofacial, seguido del biotipo mesofacial con 139 piezas y finalmente el biotipo braquifacial con 123 piezas. Respecto a la evaluación de los terceros molares retenidos en relación con su posición y biotipo facial, se encontró 63 3MR en posición mesioangular y 28 en posición distoangular en dólcofacial, seguido de 48 piezas en posición vertical en braquifacial. **Conclusiones:** No existe una relación significativa entre la cantidad de terceros molares retenidos y su posición, en relación con el biotipo facial, pero si respecto a la relación entre el sexo y el biotipo facial, encontrando que los varones presentan un biotipo dólcofacial con mayor frecuencia y las mujeres el biotipo braquifacial.

**Palabras clave:** frecuencia, terceros molares retenidos, biotipo facial.

## SUMMARY

**Objective:** This study aims to determine the frequency of retained third molars in relation to facial biotype, the data were collected by using the patients' 2D studies (panoramic and cephalometric) attending the imaging center ZETA-EXMED in the period November 2018 to December 2021, in the city of Lima, Peru. **Methods:** The type of study used for this research are observational, descriptive, cross-sectional, and retrospective. For the present study, 6000 cases were evaluated, each case consists of one panoramic radiographic image and one cephalometric image, both taken to the patient on the same date, of these, only 150 cases that met the selection criteria were included in this study. Measurements were done by a trained and calibrated researcher, using NemoCeph software for the cephalometric tracing. The statistical analysis was done using SPSS program version 1.0.0.1401 (SPSS Inc., USA) and the Chi square test ( $p < 0.05$ ). **Results:** Of the 150 cases observed, 91 were women (60.66%) and 59 were men (39.33%). According to the results, dolichofacial biotype had the highest frequency among males with a total of 27 cases (45.80%), while the brachyfacial biotype was more prevalent among females, with a total of 35 cases (38.50%). In addition, out of the total number of retained third molars evaluated (403 pieces), 141 were present in cases with dolichofacial biotype, followed by the mesofacial biotype with 139 pieces and finally the brachyfacial biotype with 123 pieces. Regarding the evaluation of retained third molars according to their position and facial biotype, 63 retained third molars were found in mesioangulated position and 28 retained third molars in dolichofacial / distoangular position, followed by 48 pieces in the vertical position in brachyfacial. **Conclusions:** There is not significant association between the quantity of retained third molars and their positions, in relation to facial biotype, although there is a significant association between facial biotype and the patient's sex, so it was concluded that Dolichofacial biotype has the highest frequency in males, while the Brachyfacial biotype is seen more frequently among females.

**Keywords:** Frequency, retained third molars, facial biotype.

## INTRODUCCIÓN

La importancia de la imagenología en odontología es realizar un examen sistemático, siendo de suma importancia para hacer una correcta evaluación y así llegar a un diagnóstico adecuado del estado del paciente, ya que proporciona información que, en muchos casos, no es posible obtener únicamente con el examen clínico, lo que permite la identificación de diversas patologías y alteraciones óseas y dentarias, observadas con frecuencia durante la atención realizada por el cirujano dentista. (1-4)

Los terceros molares, son las últimas piezas dentales en erupcionar, y pueden llegar a presentar una gran cantidad de alteraciones, algunas relacionadas a su ubicación y/o posición, estas pueden estar ligadas con el aumento de la densidad del hueso que lo rodea o por tejidos blandos adyacentes muy queratinizados además de la angulación de piezas dentales contiguas o de la misma pieza, por lo que las fuerzas eruptivas serán insuficientes para superar estas barreras, la clasificación de Winter sirve para evaluar la inclinación del diente retenido en relación al eje del segundo molar. Se le considera diente retenido a la pieza cuya corona se encuentra aún dentro del hueso, pero el desarrollo de sus forámenes apicales ha llegado a su fin, por lo cual se afirma que ha fallado en su proceso de erupción para llegar a su posición ideal. (5-13)

Por otro lado, el biotipo facial está basado en variantes de proporción músculo esquelético que tienen relación con la dirección del crecimiento craneal; esto se encuentra conectado con factores hereditarios, ambientales o sistémicos que pueden dar como resultado valores predominantes entre las dimensiones verticales y horizontales del rostro, además el diámetro y el espacio de las arcadas depende de la forma de la cara por lo que está en relación a la probabilidad de encontrar terceros molares retenidos (3MR), sobre todo en pacientes dólcofacial caracterizados por presentar el rostro alargado en sentido vertical y estrechamiento de ambas arcadas. El análisis de Ricketts y el índice de VERT son los estudios de elección y los más confiables para la determinación del biotipo facial. (14-24)

La importancia de evaluar 3MR y contrastarlos con el biotipo facial es tener un diagnóstico temprano para efectuar un plan de tratamiento adecuado y así predecir como podría ser el desarrollo de la pieza dental y en los casos que fuera necesario evaluar el abordaje quirúrgico en cirugía Maxilofacial. En ortodoncia se considera un factor importante la existencia de suficiente estructura ósea; si los terceros molares son extraídos antes de la cirugía, beneficiaría ampliamente en la remodelación ósea y así mismo en la evolución del paciente para continuar con el tratamiento planeado sea de movimiento dental o abordaje quirúrgico. (25-35)

No hay suficiente evidencia en la literatura que soporte la prevalencia entre el biotipo facial y los 3MR, sin embargo, algunos estudios han determinado que el biotipo facial si está relacionado a esto. Es importante que se siga evaluando el tema para ver si efectivamente esta relación de variables existe o no. Por lo tanto, el propósito del presente estudio pretende determinar la frecuencia de 3MR con relación al biotipo facial por medio de estudios imagenológicos 2D y así obtener un diagnóstico temprano de 3MR para su posterior evaluación y plan de tratamiento en pacientes con un biotipo facial determinado, beneficiando a los cirujanos dentistas en sus tratamientos.

## MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo y se desarrolló usando imágenes radiográficas digitales de pacientes atendidos en el centro especializado en radiología bucal y maxilofacial Zeta-Exmed en el periodo noviembre del 2018 a diciembre del 2021, en Lima, Perú, a los cuales se les realizó una radiografía panorámica y una radiografía cefalométrica, siendo justificadas bajo la necesidad de evaluación general, previa al tratamiento de ortodoncia. La muestra estuvo conformada por 6000 casos de radiografías digitales, cada uno compuesto por una radiografía panorámica y una cefalométrica, que fueron tomadas en la misma cita con el equipo radiográfico de la marca PointNix, modelo 800S HD Plus (fabricado en Corea). La muestra fue determinada siguiendo los criterios de selección previamente establecidos. El análisis de imágenes panorámicas para evaluar la posición de los terceros molares retenidos de ambas arcadas de acuerdo con la clasificación de Winter se realizó con el software original del equipo, CDX, y el análisis cefalométrico de Vert para determinar el biotipo facial, se realizó con el software NemoStudio Fall Edition 2020 (NemoCeph). Todas las mediciones fueron realizadas por un investigador previamente calibrado y capacitado por un especialista en radiología bucal y maxilofacial con 5 años de experiencia, además de un especialista en ortodoncia de más de 10 años de experiencia en la evaluación de los trazados cefalométricos. La calibración intraobservador se desarrolló utilizando el coeficiente de correlación intraclase (CCI); las variables fueron medidas en 2 momentos, con un intervalo de 5 minutos, hasta obtener valores mayores a 0,7 en todas las mediciones realizadas, y la parte estadística se realizó con ayuda del programa SPSS para Windows versión 25.0, buscando identificar asociaciones entre el biotipo facial y la presencia del tercer molar retenido mediante la prueba de chi cuadrado, así como la influencia de las covariables; sexo, presencia de terceros molares y biotipo facial, con un nivel de significancia de  $p < 0,05$ .

## RESULTADOS

De un total de 6000 casos, cada uno compuesto por una radiografía panorámica y una cefalométrica, se obtuvieron un total de 150 casos que cumplieron con los criterios de selección establecidos, de los cuales, 91 correspondieron al sexo femenino (60,66%) y 59 al sexo masculino (39,33%). La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 36 años en los casos incluidos. Se encontró que el biotipo dolicofacial fue el más frecuente en hombres, con 27 casos (45,80%), mientras que las mujeres representaron una mayor frecuencia al biotipo braquifacial con 35 casos (38,50%).

Se observó que dentro de los 150 casos (100%), hubo 403 3MR, 48 de las cuales estaban en posición vertical correspondientes al biotipo braquifacial alcanzando la mayor frecuencia en esta distribución. También se encontró en las 3MR mesioanguladas que 63 correspondían al biotipo dolicofacial tomando el valor más alto en esta distribución. También se encontró que las 3MR distoanguladas dieron como resultado un total de 28 estando principalmente en el biotipo dolicofacial. Además, se encontraron 3MR en posición horizontal, invertidas y en posición ectópica con los valores de 8, 7, y 12 3MR respectivas a los biotipos dolicofacial, braquifacial y mesofacial, respectivamente. La asociación de 3MR con el biotipo facial dio como resultado que la suma de todos los dientes correspondientes a cada biotipo facial fueron 123 3MR correspondientes al biotipo braquifacial, 139 3MR al biotipo mesofacial, y en el biotipo dolicofacial se encontraron 141 3MR. se observa la asociación entre el biotipo facial y el número de 3MR, lo que dio como mayor resultado los casos con biotipo facial braquifacial, mesofacial y dolicofacial los que presentaban 2 3MR (con valores de 17, 18, 18 respectivamente a los biotipos faciales anteriormente mencionados), pero los resultados no fueron significativos. La asociación entre el biotipo facial y la posición de 3MR por cuadrante esta descrita en la tabla 3, resaltando que no hubo diferencia significativa ( $p > 0,05$ ).

## DISCUSIÓN

El propósito de esta investigación fue determinar la relación que existe entre la retención de terceros molares con el biotipo facial mediante radiografías panorámicas y cefalométricas de pacientes de ambos sexos entre las edades de 18 a 36 años. Para comprobar el biotipo de cada paciente, se emplearon medidas del análisis de Ricketts y el índice de VERT, tal como lo utilizaron Cerda-Peralta et al. (24), quienes indicaron que es uno de los análisis más estables y reproducibles para la definición del biotipo facial. Al referirnos a la relación existente entre biotipo facial y la frecuencia de terceros molares retenidos, nos referimos a que la frecuencia de estas piezas retenidas podría ser más predominante en algún biotipo facial que en otro. Por ejemplo, siguiendo las características de cada uno de ellos, los pacientes dólicofaciales, al tener una diferencia más acentuada en sentido vertical que en horizontal presentando arcadas más angostas. Además, podrían tener falta de espacios para las piezas dentales y eso estaría relacionado con que presenten una mayor probabilidad de retención de los terceros molares; sin embargo, esto fue descartado en nuestro estudio. Los resultados del presente estudio muestran que no hubo asociación significativa entre la posición del tercer molar y el biotipo facial, lo que muestra una discrepancia mínima entre biotipos y hace que los clínicos no predispongan una asociación entre estas dos variables. Estos resultados son similares con algunos estudios como el de Lindauer (26), en el cual hacen mención que tampoco hubo relación significativamente importante entre la retención del tercer molar y el apiñamiento anterior. Asimismo, Cerda-Peralta et al. (18, 24) señalaron que existen otros factores diferentes de la edad y el biotipo facial, relacionados con aspectos físicos importantes como el dimorfismo sexual, que serían significativos, con diferencias marcadas en hombres y mujeres que podrían ser relevantes para determinar la retención de un tercer molar y otros factores relacionados con el aspecto físico. Otras consideraciones importantes respecto a la impactación de estos dientes que se deben de tener en cuenta incluyen lo señalado por Nery et al. (7), quienes llegaron a la conclusión de que la retención de los terceros molares dependía directamente del tamaño de la arcada y el espacio destinado a cada pieza dentaria, más que el biotipo facial. Días Ribeiro et al. (8) hicieron mención que se puede evaluar la posición de estas piezas según la relación del tercer molar al segundo molar, y también según Castañeda et al. (15) que encontraron en la mayoría de estas piezas retenidas en el maxilar estaban en posición distoangulada, mientras que en la mandíbula estas piezas estaban mesioanguladas. Más allá, en nuestro estudio los resultados señalaron que no existe asociación entre la posición de los terceros molares retenidos y el biotipo facial. Esto podría deberse a estos otros factores etiológicos que tienen más influencia que el biotipo facial. Finalmente, en nuestro estudio no se encontró relación significativa entre la frecuencia de retención de los terceros molares con el biotipo facial, además se encontró relación significativa entre el biotipo facial con relación al sexo de los casos revisados, igualmente no se encontró relación significativa entre la frecuencia de retención de los terceros molares y la edad de los pacientes.

## CONCLUSIONES

La posición de los terceros molares retenidos no está asociada con el biotipo facial. Este resultado debería ser tenido en cuenta por los clínicos al momento de realizar un diagnóstico de impactación. Agradecimientos: Al centro radiográfico Zeta-Exmed por el apoyo brindado al proporcionar las imágenes 2D utilizados en este estudio.

Contribución de los autores: Taylor Augusto Zeta Rodríguez ha participado en la concepción, recopilación de información, realizando el análisis e interpretación de los datos, así como la redacción y aprobación de la versión final del artículo.

Fuente de financiamiento: Autofinanciado. Conflicto de intereses: El autor declaran no tener ningún conflicto de intereses.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Masthoff M, Gerwing M, Masthoff M, Timme M, Kleinheinz J, Berninger M, et al. Dental Imaging - A basic guide for the radiologist. *Rofo*. 2019;191(3):192-8. DOI: 10.1055/a-0636-4129.
2. Cappuccio HR, Roca MIR. Reconocimiento de las estructuras anatómicas normales del maxilar y de la mandíbula en las radiografías intraorales apicales retro alveolares Parte II - Mandíbula. *Actas Odontol*. 2011. 8(1):15-26. ISSN 1510-8139. Disponible en: <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/actasodontologicas/article/view/1045>.
3. Tronje G, Welander U, McDavid WD, Morris CR. Image distortion in rotational panoramic radiography. I. General considerations: I. General considerations. *Acta Radiol Diagn (stockh)*. 1981;22(3A):295-9. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.joms.2020.06.014>.
4. Martinez ME, Martinez BAM, Bruno IG. Radiografía panorámica en la práctica dental: alcances y limitaciones. *RAAO*. 2008; 47(2). Disponible en: <https://www.ateneo-odontologia.org.ar/articulos/xlvii02/articulo2.pdf>.
5. Ifesanya JU, Aladelusi TA. Third molar impaction in a cross section of adult orthodontic patients. *J Dent Assoc S Afr*. 2018; 73(1):23-6. [http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0011-85162018000100005&Ing=pt&nrm=iso](http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-85162018000100005&Ing=pt&nrm=iso).
6. Al-Abdallah M, AlHadidi A, Hammad M, Dar-Odeh N. What factors affect the severity of permanent tooth impaction?. *BMC Oral Health*. 2018;18(1):184. DOI: 10.1186/s12903-018-0649-5.
7. Nery FS, Santos LD, Sarmiento VA, Santana EJB. Avaliação da prevalência de terceiros molares inferiores inclusos e da posição e inclinação do seu longo eixo em radiografias panorâmicas. *Rev Ciênc Médicas Biol*. 2006;5(3) DOI: <http://dx.doi.org/10.9771/cmbio.v5i3.4130>.
8. Dias-Ribeiro E, Lima-Júnior J, Barbosa JL, et al. Prevalencia de la posición de terceros molares inferiores retenidos con relación a la clasificación de Pell & Gregory. *Rev Odontol Mex*. 2009;13(4):229-33. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_abstract&pid=S1870-199X2009000400229&Ing=es&nrm=iso](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-199X2009000400229&Ing=es&nrm=iso).
9. Rodrigues D, Terra GA. Prevalência de terceiros molares e suas respectivas posições segundo as classificações de Winter e de Pell e Gregory. *Rev Cir Traumatol Buco-Maxilo-fac. Camaragibe* 2009;9(1)83 – 92. Lil: lil-524679.
10. Vandeplas C, Vranckx M, Hekner D, Politis C, Jacobs R. Does Retaining Third Molars Result in the Development of Pathology Over Time? A Systematic Review. *J Oral Maxillofac Surg*. 2020;78(11):1892-908. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joms.2020.06.014>.
11. Khojastepour L, Khaghaninejad MS, Hasanshahi R, Forghani M, Ahnari F. Does the Winter or Pell and Gregory classification system indicate the apical position of impacted mandibular third molars?. *J Oral and Maxillofac Surg*. 2019;77(11):2222.e1-2222.e9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joms.2019.06.004>.
12. Primo FT, Primo BT, Scheffer MAR, Hernández PAG, Rivaldo EG. Evaluation of 1211 third molar position according to the classification of winter, Pell & Gregory. *Int j odontostomatol*. 2017;11(1):61-5. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-381x2017000100009>.

13. Al-Anqudi SM, Al-Sudairy S, Al-Hosni A, Al-Maniri A. Prevalence and Pattern of Third Molar Impaction: A retrospective study of radiographs in Oman. *Sultan Qaboos Univ Med J*. 2014;14(3):e388-92. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25097776/>.
14. Niño-Sandoval TC, Frazão M, Vasconcelos BCE. Differences in skeletal growth patterns: an exploratory approach using elliptic Fourier analysis. *Clin Oral Investig*. 2021;25(4):2007-15. DOI: 10.1007/s00784-020-03509-9.
15. Castañeda DA, Briceño CR, Sánchez AE, Rodríguez A, Castro D, Barrientos S. Prevalencia de dientes incluidos, retenidos e impactados analizados en radiografías panorámicas de población de Bogotá, Colombia. *Univ Odontol*. 2015 Jul-Dic; 34(73): 149-157. DOI: <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.uo34-73.pdir>.
16. Paixão MB, Sobral MC, Vogel CJ, Araujo TM. Estudo comparativo entre traçados cefalométricos manual e digital, através do programa Dolphin Imaging em telerradiografias laterais. *Dental Press J Orthod*. 2010;15(6):123-30. DOI: <http://doi.org/10.1590/S2176-94512010000600016>.
17. Chen SK, Chen YJ, Yao CC, Chang HF. Enhanced speed and precision of measurement in a computer-assisted digital cephalometric analysis system. *Angle Orthod*. 2004;74(4):501-7. DOI: [https://doi.org/10.1043/0003-3219\(2004\)074<0501:ESAPOM>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1043/0003-3219(2004)074<0501:ESAPOM>2.0.CO;2).
18. Schulz-Rosales R, Núñez-Guerrero M, Cerda-Peralta B, Rivera-Rothgaenger M, Ponce de León E, López-Garrido J, Romo-Ormazábal F. Características esqueléticas para la determinación cualitativa del biotipo facial en telerradiografía lateral: Estudio Piloto. *Rev clín de periodoncia implantol rehabil oral*. 2018;11(3):164-6. DOI: 10.4067/S0719-01072018000300164|.
19. Shetty D, Kumar D, Goyal S, Sharma P. A Cephalometric Study of Various Horizontal Reference Planes in Natural Head Position. *J Ind Orthod Soc*. 2013;47(3):143-147. DOI: 10.5005/jp-journals-10021-1146.
20. Kumar M, Kumari S, Chandna A, Konark, Singh A, Kumar H, et al. Comparative Evaluation of CephNinja for Android and NemoCeph for Computer for Cephalometric Analysis: A Study to Evaluate the Diagnostic Performance of CephNinja for Cephalometric Analysis. *J Int Soc Prev Community Dent*. 2020; 15;10(3):286-291. DOI: 10.4103/jispcd.JISPCD\_4\_20.
21. Wahl N. Orthodontics in 3 millennia. Chapter 8: The cephalometer takes its place in the orthodontic armamentarium. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2006;129(4):574–80. DOI: 10.1016/j.ajodo.2006.01.013.
22. Martínez V, Schulz R, Cerda B, Rivera M, López J, Mora N, Romo F. Paralelismo entre plano oclusal y 3 planos cefalométricos. *Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral*. 2015;8(3):234-238. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.piro.2015.09.009>.
23. Govea SLA, Ballesteros LM. Relación entre el plano SN y el plano de Frankfort, según el biotipo facial. *Rev Mex Ortodon*. 2016;4(1):18-23. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2016/mo161c.pdf>.
24. Cerda-Peralta B, Schulz-Rosales R, López-Garrido J, Romo-Ormazabal F. Parámetros cefalométricos para determinar biotipo facial en adultos chilenos. *Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral*. 2019;12(1):8-11. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0719-01072019000100008>.

25. Inda K, Gutiérrez-Rojo J, Gutiérrez-Villaseñor J. Concordancia del biotipo facial con el patrón de crecimiento facial en mujeres y hombres. *KIRU*. 2019;16(4):137-140. DOI: <https://doi.org/10.24265/kiru.2019.v16n4.01>.
26. Lindauer SJ, Laskin DM, Tufekci E, Taylor RS, Cushing BJ, Best AM. Orthodontists' and surgeons' opinions on the role of third molars as a cause of dental crowding. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2007;132(1):43-8. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2005.07.026>.
27. Costea MC, Bondor CI, Muntean A, Badea ME, Mesaros AS, Kuijpers-Jagtman AM. Proximity of the roots of posterior teeth to the maxillary sinus in different facial biotypes. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2018;154(3):346-55. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2018.01.006>.
28. Crincoli V, Tettamanti L, Lucchina AG, Dedola A, Cazzolla AP, Lacaíta MG, et al. Correlation Between Maxillary Canine Impaction and Facial Biotype. *J Craniofac Surg*. 2019;30(4):1044-8. DOI: 10.1097/SCS.0000000000005279.
29. Vasquez JC. Relación entre la posición de los incisivos con el biotipo facial y la clase esquelética en análisis radiográficos de sujetos de 18 a 30 años de edad [Tesis Doctoral]: Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de medicina humana, Escuela de estomatología. 2018.
30. Garcia FD. Estudio epidemiológico de terceros molares superiores retenidos, en relación a la biotipología cráneo-facial, en pacientes dentados de entre 18 y 40 años de edad, en la ciudad de Córdoba (República Argentina) [Tesis Doctoral]: Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Odontología. 2009.
31. Perez LR. Posición de terceras molares mandibulares, según la clasificación de Pell y Gregory, y su relación con el biotipo facial, en pacientes de 18 a 40 años, del servicio de ortodoncia, del Hospital Santa Rosa, años 2008-2016 [Tesis Doctoral]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2018.
32. Ramírez L. Posiciones e inclinaciones de estructuras dentoalveolares en pacientes con mordida abierta y profunda según el biotipo facial [Tesis Doctoral]: Universidad Nacional Mayor De San Marcos. 2015.
33. Schmidt AP, Rossi AC, Freire AR, Groppo FC, Prado FB. Association between Facial Type and Mandibular Canal Morphology - Analysis in Digital Panoramic Radiographs. *Braz Dent J*. 2016;27(5):609-12. DOI: <http://doi.org/10.1590/0103-6440201600973>.
34. Sánchez-Tito MA, Yañez-Chávez EE. Asociación entre el biotipo facial y la sobremordida: Estudio piloto. *Rev estomatol hered*. 2015;25(1):05-11. [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552015000100002&script=sci\\_abstract](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-43552015000100002&script=sci_abstract).
35. Richardson ME. The role of the third molar in the cause of late lower arch crowding: a review. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1989;95(1):79-83. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/0889-5406\(89\)90139-x](http://dx.doi.org/10.1016/0889-5406(89)90139-x).

ANEXOS


ANEXO 1: FIGURAS



**Figura 1.** Coronas en evolución intraosea, tercera molar inferior derecha incluida 4.8 (A), tercera molar inferior izquierda incluida 3.8 (B).



**Figura 2.** Coronas intraoseas, tercera molar inferior retenida en posición transversal 4.8 (A), tercera molar inferior izquierda retenida en posición transversal 3.8 (B).



**Figura 3.** Tercera molar inferior derecha impactada 4.8 (A), tercera molar inferior izquierda impactada 3.8 (B).






Figura 6. Radiografía cefalométrica con trazados del índice de VERT de Ricke valores de la cefalometría concluyendo en dolicofacial (B).




Figura 7. Radiografía cefalométrica con trazados del índice de VERT de R (A), valores de la cefalometría concluyendo en mesofacial (B).




Figura 8. Radiografía cefalométrica con trazados del índice de VERT de R (A), valores de la cefalometría concluyendo en braquifacial (B).

ANEXO 2: TABLAS

**Tabla 1. Distribución del biotipo facial según sexo**

Sexo	Biotipo Facial				P
	Braquifacial	Mesofacial	Dolicofacial	Total	
Masculino	n	15	17	27	0.031*
	%	25.40%	28.80%	45.80%	
Femenino	n	35	33	23	
	%	38.50%	36.30%	25.30%	
Total	n	50	50	50	
	%	33.30%	33.30%	33.30%	

**Test de Chi cuadrado**  
\* significativo

**Tabla 2. Asoci** **tre el biotipo facial y el número de terceras molares retenidas.**

Biotipo Facial	Número de terceras molares retenidas					P
	1	2	3	4	Total	
Braquifacial	n	12	17	7	14	0.208
	%	24.00%	34.00%	14.00%	28.00%	
Mesofacial	n	5	18	11	16	
	%	10.00%	36.00%	22.00%	32.00%	
Dolicofacial	n	3	18	12	17	
	%	6.00%	36.00%	24.00%	34.00%	

**Test de Chi cuadrado**

**Tabla 3. Asociación entre el biotipofacial y la posición de la tercera molar retenida por cuadrante.**

Biotipo Facial		Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante I					Total	P
		Vertical	Mesioangulada	Distoangulada	Invertida	Ectópica		
Braquifacial	n	13	3	8	1	0	25	0.281
	%	52.00%	12.00%	32.00%	4.00%	0.00%	100.00%	
Mesofacial	n	11	3	13	0	3	30	
	%	36.70%	10.00%	43.30%	0.00%	10.00%	100.00%	
Dolicofacial	n	13	5	13	0	0	31	
	%	41.90%	16.10%	41.90%	0.00%	0.00%	100.00%	

Biotipo Facial		Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante II				Total	P
		Vertical	Mesioangulada	Distoangulada	Ectópica		
Braquifacial	n	13	3	11	1	28	0.899
	%	46.40%	10.70%	39.30%	3.60%	100.00%	
Mesofacial	n	12	3	12	3	30	
	%	40.00%	10.00%	40.00%	10.00%	100.00%	
Dolicofacial	n	15	5	14	1	35	
	%	42.90%	14.30%	40.00%	2.90%	100.00%	

Biotipo Facial		Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante III					Total	P
		Vertical	Mesioangulada	Distoangulada	Invertida	Ectópica		
Braquifacial	n	12	19	0	5	1	37	0.223
	%	32.40%	51.40%	0.00%	13.50%	2.70%	100.00%	
Mesofacial	n	5	27	1	4	3	40	
	%	12.50%	67.50%	2.50%	10.00%	7.50%	100.00%	
Dolicofacial	n	3	27	1	4	2	37	
	%	8.10%	73.00%	2.70%	10.80%	5.40%	100.00%	

Biotipo Facial		Posición de la tercera molar retenida en el cuadrante IV				Total	P	
		Vertical	Mesioangulada	Horizontal	Invertida			Ectópica
Braquifacial	n	10	20	1	1	1	33	0.080
	%	30.30%	60.60%	3.00%	3.00%	3.00%	100.00%	
Mesofacial	n	5	25	6	0	3	39	
	%	12.80%	64.10%	15.40%	0.00%	7.70%	100.00%	
Dolicofacial	n	3	26	8	0	1	38	
	%	7.90%	68.40%	21.10%	0.00%	2.60%	100.00%	

**Test de Chi cuadrado**

## ANEXO 3: RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS.



### RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS Y NOMBRAMIENTO DEL ASESOR

#### RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA N° 075- POSG-DACE-DAFCS-U. CIENTÍFICA-2022

Lima, 04 de noviembre del 2022.

#### VISTO:

El informe técnico del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Científica del Sur con código N° 202-2021-POS8 se aprueba el proyecto de Tesis Titulado: "FRECUENCIA DE TERCERAS MOLARES RETENIDAS CON RELACIÓN AL BIOTIPO FACIAL UTILIZANDO ESTUDIOS EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS Y CEFALOMÉTRICAS" presentado por ZETA RODRIGUEZ, TAYLOR AUGUSTO.

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Reglamento General de la Universidad Científica del Sur y los reglamentos de pre/posgrado para obtener el Título de Segunda Especialidad en **RADIOLOGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL** en la Carrera de Estomatología de la Universidad Científica del Sur, se debe desarrollar un trabajo de investigación.

Que, de acuerdo con la normativa vigente de la Universidad Científica del Sur, en uso de las atribuciones conferidas al Director Académico de Carrera.

#### SE RESUELVE:

**ART. 1°: APROBAR E INSCRIBIR** el Proyecto de Tesis titulado: "FRECUENCIA DE TERCERAS MOLARES RETENIDAS CON RELACIÓN AL BIOTIPO FACIAL UTILIZANDO ESTUDIOS EN RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS Y CEFALOMÉTRICAS" del **CD. ZETA RODRIGUEZ, TAYLOR AUGUSTO**, con registro: N° 202-2021-POS8 y establecer el inicio de periodo de ejecución del mencionado proyecto hasta 02 de mayo de 2024.

**ART. 2°: NOMBRAR** Asesor/a del trabajo de tesis señalado, al **Dr. CD. ARRIOLA GUILLÉN, LUIS ERNESTO**.

Regístrese, comuníquese y archívese.




**Dr. Claudio Peña Soto**  
Director Académico de la Carrera de Estomatología

T//070-60-6788  
informes@cientificadusur.pe  
cientificadusur.pe

## ANEXO 4: PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO

Link de publicación de artículo: <https://doi.org/10.21142/2523-2754-1002-2022-105>

- Citar como: Zeta-Rodríguez TA. Frecuencia de terceros molares retenidos con relación al biotipo facial. Un estudio transversal. Rev Cient Odontol (Lima). 2022; 10(2): e105. DOI: 10.21142/2523-2754-1002-2022-105